

## LISTA KONTROLNA PRZED ROZPOCZĘCIEM LECZENIA LINORION

### Lenalidomid

Lista kontrolna ma pomóc lekarzowi przepisującemu lek w doradzaniu pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia lenalidomidem, aby zapewnić jego bezpieczne i prawidłowe stosowanie. Proszę wybrać odpowiednią kolumnę dla kategorii ryzyka pacjenta i zapoznać się z dostarczonymi poradami.

Porada	Kobiety w wieku rozroczym	Kobiety niezdolne do zajścia w ciążę	Mężczyźni
Poinformuj o przewidywanym ryzyku teratogennym dla nienarodzonego dziecka	●	●	●
Poinformuj o potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji** przez co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia, przez cały okres leczenia, w tym podczas przerw w leczeniu oraz przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia lub o stosowaniu bezwzględnej i ciągłej abstynencji seksualnej.	●		
Poinformuj, że nawet w przypadku braku miesiączki pacjentka musi zastosować się do zaleceń dotyczących antykoncepcji	●		
Potwierdź, czy pacjentka jest w stanie zastosować środki antykoncepcyjne	●		
Poinformuj o spodziewanych konsekwencjach ciąży i potrzebie szybkiej konsultacji, jeśli istnieje ryzyko ciąży	●		●
Poinformuj o konieczności natychmiastowego przerwania leczenia w przypadku podejrzenia ciąży u pacjentki	●		
Potwierdź, że pacjentka zgadza się na przeprowadzanie testów ciążowych co najmniej co 4 tygodnie, chyba że zostanie potwierdzona sterylizacja jajowodów	●		
Poinformuj o zagrożeniach i niezbędnych środkach ostrożności związanych ze stosowaniem lenalidomidu	●	●	●
Poinformuj pacjenta, aby nie udostępnił leku	●	●	●
Poinformuj o zwrocie niewykorzystanych kapsułek do apteki	●	●	●
Poinformuj, aby nie oddawać krwi podczas przyjmowania lenalidomidu, podczas przerw w leczeniu i przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia	●	●	●

Poinformuj o konieczności stosowania prezerwatyw, także przez tych mężczyzn, którzy przeszli wazektomię, ponieważ płyn nasienny może nadal zawierać lenalidomid pomimo braku plemników, przez cały czas trwania leczenia, podczas przerwy w dawkowaniu oraz przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia, jeśli partnerka jest w ciąży lub jeśli w wieku rozrodczym nie stosuje skutecznej antykoncepcji			●
Poinformuj o konieczności nieoddawania nasienia lub spermy w trakcie leczenia, podczas przerw w dawkowaniu oraz przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia			●
Poinformuj o ryzyku zakrzepowo-zatorowym i ewentualnej konieczności stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej podczas leczenia lenalidomidem	●	●	●
Poinformuj z jakich skutecznych metod antykoncepcji może skorzystać pacjentka lub partnerka pacjenta	●		●
Poinformuj pacjenta, że jeśli jego partnerka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania przez niego lenalidomidu lub wkrótce po zaprzestaniu przyjmowania lenalidomidu, powinien natychmiast poinformować o tym swojego lekarza prowadzącego i że zaleca się skierowanie partnerki pacjenta do lekarza specjalizującego się lub posiadającego doświadczenie w teratologii w celu dokonania oceny i udzielenia porady lekarskiej			●

\*Zapoznaj się z przewodnikiem dla fachowych pracowników ochrony zdrowia, aby poznać kryteria określania, czy pacjentka jest kobietą nieplodną.

\*\*Informacje na temat antykoncepcji można znaleźć w przewodniku dla fachowych pracowników ochrony zdrowia.

	Kobiety w wieku rozrodczym	Kobiety niezdolne do zajścia w ciążę	Mężczyźni
Skierowanie w celu uzyskania <b>porady w sprawie antykoncepcji</b> , jeśli nie ustalono skutecznej antykoncepcji			
Skierowanie w sprawie antykoncepcji wymagane	●		
Skierowanie w sprawie antykoncepcji wystawione	●		
Konsultacja w sprawie antykoncepcji zakończona	●		

<b>Zapobieganie ciąży</b> Pacjentka jest obecnie objęta jedną z poniższych metod przez co najmniej 4 tygodnie	Kobiety w wieku rozrodczym	Kobiety niezdolne do zajścia w ciążę	Mężczyźni
Implant antykoncepcyjny	●		
System domaciczny uwalniający lewonorgestrel	●		
Zawiesina octanu medroksyprogesteronu	●		
Sterylizacja	●		
Stosunek płciowy wyłącznie z partnerem poddanym wazektomii: wazektomia musi być potwierdzona ujemnym wynikiem badania nasienia	●		
Tabletka zawierająca wyłącznie progesteron hamująca owulację (dezogestrel)	●		
Pacjentka zobowiązuje się do całkowitej i absolutnej abstynencji seksualnej	●		
Ujemny test ciążowy przed rozpoczęciem leczenia	●		

<b>Pacjentka niezdolna do zajścia w ciążę</b> Jedno z następujących kryteriów zostało spełnione w celu ustalenia, czy pacjentka nie jest zdolna do zajścia w ciążę	Kobiety w wieku rozrodczym	Kobiety niezdolne do zajścia w ciążę	Mężczyźni
Kobieta niezdolna do zajścia w ciążę		●	
Przedwczesna niewydolność jajników potwierdzona przez specjalistę ginekologa		●	
Obustronna resekcja jajników i jajowodów		●	
Genotyp XY, zespół Turnera, agenezja macicy		●	

\*\*\*Brak miesiączki po leczeniu onkologicznym lub w okresie karmienia piersią nie wyklucza możliwości zajścia w ciążę

**NIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ LECZENIA U KOBIETY W WIEKU ROZRODCZYM DOPÓKI PACJENTKA NIE ZASTOSUJE CO NAJMNIEJ JEDNEJ SKUTECZNEJ METODY ANTYKONCEPCJI NA CO NAJMNIEJ 4 TYGODNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM LECZENIA LUB NIE ZOBOWIĄŻE SIĘ DO ROZPOCZĘCIA I KONTYNUACJI ABSTYNENCJI SEKSUALNEJ A WYNIK TESTU CIĄŻOWEGO JEST NEGATYWNY.**

